



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказ Министерства здравоохранения РФ № 1122н от 06.12.2021 "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

ВОЗРАСТ ИНФЕКЦИЯ	ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ														ВЗРОСЛЫЕ				
	МЕСЯЦЫ										ГОДЫ				ГОДЫ				
	0	1	2	3	4,5	6	12	15	18	20	6	7	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+
ТУБЕРКУЛЕЗ	3-7 сут																		
ГЕПАТИТ В	V1	V2				V3													
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ			V1		V2			RV											
КОКЛЮШ				V1	V2	V3			RV1										
ДИФТЕРИЯ				V1	V2	V3			RV1			АДС-м	АДС-м					КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕВАКЦИНАЦИИ АДС-м	
СТОЛБНЯК				V1	V2	V3			RV1			RV2	RV3						
ПОЛИОМИЕЛИТ				V1 ипв	V2 ипв	V3 ипв			RV1 ипв	RV2 опв		RV3 опв	RV3 ипв						
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ				V1	V2	V3			RV										
КОРЬ								V1				V2							
КРАСНУХА								V1				V2			ДЕВУШКИ				
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ								V1				V2							
ГРИПП																		ЕЖЕГОДНО	
ВСЕМ ЛИЦАМ ДАННОЙ ГРУППЫ				ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА, ПО ПОКАЗАНИЯМ, ПРИЗЫВНИКАМ (ГРИПП)						РАНЕЕ НЕ ПРИВЫТЫМ, НЕ БОЛЕВШИМ, НЕ ИМЕЮЩИМ СВЕДЕНИЙ И ОДНОКРАТНО ПРИВЫТЫМ (ДЛЯ КОРИ И КРАСНУХИ)									
V1, 2, 3 - ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВАКЦИНАЦИИ				ИПВ - ИНАКТИВИРОВАННАЯ ПОЛИОМЕЛИТНАЯ ВАКЦИНА						АДС-м - АНАТОКСИН ДИФТЕРИЙНО-СТОЛБНЯЧНЫЙ ОЧИЩЕННЫЙ С УМЕНЬШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТИГЕНОВ									
RV1, 2, 3 - ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР РЕВАКЦИНАЦИИ				ОПВ - ОРАЛЬНАЯ ПОЛИОМЕЛИТНАЯ ВАКЦИНА															

Рекомендуемая вакцинация от инфекций, не включенных в Национальный календарь иммунопрофилактики:

Ветряная оспа, опоясывающий лишай: Вакцинация проводится с возраста 1 года 2 дозами с интервалом 3 месяца между прививками.

Гепатит А: вакцинация с 1 года жизни, в зависимости от вида вакцины: 2 дозами с интервалом 6-12 мес.

Менингококковая инфекция: вакцинация с 2-3 месячного возраста, в зависимости от вида вакцины и возраста прививаемого 1-2 дозами с интервалом 3 месяца.

Ротавирусная инфекция: первая доза вводится между 6-12 неделями жизни, пропустившим эти сроки детям 1-я доза вводится не позднее 104 дня жизни (14 недель+6 дней), 3 дозами с интервалом 30-45 дней. 3-я доза вводится не позднее возраста 8 месяцев.

Папилломавирусная инфекция: вводится девочкам-подросткам 9-17 лет и женщинам 18-45 лет 3 дозами, по схеме 0-2-6 или 0-1-6 мес. в зависимости от вида вакцины

Коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2): дети 12-17 лет - добровольно при наличии заявления одного из родителей (или иного законного представителя).